



ロンサーフ+サイラムザ療法

患者名: 患者 ID: 身長: 体重: ( 月 日測定)

主治医: 指導医: 年齢: 体表面積: CREA: ( 月 日採血)

B型肝炎ウイルス:HBs 抗原(+・-)HBs 抗体(+・-) HBc 抗体(+・-) HBV-DNA 定量( ・陰性)

CHEMOTHERAPY REGIMEN

1サイクルを28日としてPDまで繰り返す。

Table with 7 columns (Drug, Dose, 1week, 2week, 3week, 4week, 5week, 6week) and 3 rows (サイラムザ, ロンサーフ, 催吐性リスク)

day1

0. 22μのインラインフィルターを使用すること。(サイラムザ)

処方)レスタミンコーワ錠10mg5錠 点滴①開始までに内服すること。

① 生理食塩液 100ml 30分かけて滴下

② 大塚生食注 250ml 1本 サイラムザ 500mg ( )本 サイラムザ 100mg ( )本 初回60分かけて 2回目以降30分で点滴

サイラムザ8mg/kg×体重= ( ) mg

忍容性良好であれば、点滴時間を短縮できます。

③ 生理食塩液 50ml 全開で滴下

処方) ロンサーフ15mg( )錠 ロンサーフ20mg( )錠 5日間内服2日間休薬 2×10日分 朝夕食後 day1 夕～day6 朝、day8 夕～day13 朝

次ページへつづく



## ロンサーフ + サイラムザ療法

別表: ロンサーフ投与量  
(添付文書より)

1サイクル28日に対して処方日数は計10日分となります。

体表面積 (m <sup>2</sup> )	1回量	1日量	処方箋記載量	
1.07 未満	35mg	70mg	15mg2錠 20mg2錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.07 以上～ 1.23 未満	40mg	80mg	20mg4錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.23 以上～ 1.38 未満	45mg	90mg	15mg6錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.38 以上～ 1.53 未満	50mg	100mg	15mg4錠 20mg2錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.53 以上～ 1.69 未満	55mg	110mg	15mg2錠 20mg4錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.69 以上～ 1.84 未満	60mg	120mg	20mg6錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.84 以上～ 1.99 未満	65mg	130mg	15mg6錠 20mg2錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
1.99 以上～ 2.15 未満	70mg	140mg	15mg4錠 20mg4錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬
2.15 以上～	75mg	150mg	15mg2錠 20mg6錠	朝夕食後5日間内服2日間休薬

### REFERENCES:

Safety and activity of trifluridine/tipiracil and ramucirumab in previously treated advanced gastric cancer: an open-label, single-arm, phase 2 trial

[Lancet Gastroenterol Hepatol. 2021 Mar;6\(3\):209-217.](#)

制吐剤について: [日本癌治療学会 制吐剤適正使用ガイドライン](#)

FNについて: [日本臨床腫瘍学会 発熱性好中球減少症診療ガイドライン](#)

G-CSFについて: [日本癌治療学会 G-CSF 適正使用ガイドライン](#)