

津山中央病院　がん化学療法レジメン登録票

がん種	直腸結腸癌	総コース数	
レジメン名	Cetuximab (BEACON-CRC)	適応分類	周術期 / 進行再発
1 コースの期間	7 日	臨床分類	臨床研究 / 日常診療
経口抗がん薬	エンコラフェニブ±ビニメチニブ		
その他の併用薬	なし		
備考・参考	BEACON-CRC 試験　がん化学療法に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行再発の結腸直腸癌 当院患者群はマダニ咬傷既往が多いと疑われている。事前の問診で聴取しておくこと。(アービタックス) 3 剤併用とする場合、症状詳記を記載すること。(メクトビ)		

順	薬剤名	用量	経路	溶解液	時間等	投与日
1	レスタミンコーワ錠 10mg	5T	内服		開始時	1
2	デキサート 6.6mg	2V	点滴	生食 100ml	30min	1
3	アービタックス 100mg	初回 400mg/m ² 2 回目以降 250mg/m ²	点滴	生食 250ml 生食 250ml	120min 60min	1 1
4	生食 50ml	1	点滴		初回 1h 500ml/h	1
	ピラフトビ 75mg カプセル	4cap 1 × タ	内服			1-7
	メクトビ 15mg 錠 (必要な患者のみ)	6 錠 2 × 朝夕	内服			1-7