



**FP + Nivo (シスプラチン + 5FU + オプジーボ)**  
**CheckMate648 試験**

患者名: \_\_\_\_\_ 患者 ID: \_\_\_\_\_ 身長: \_\_\_\_\_ 体重: \_\_\_\_\_ ( 月 日測定)


主治医: \_\_\_\_\_ 指導医: \_\_\_\_\_ 年齢: \_\_\_\_\_ 体表面積: \_\_\_\_\_ CREA: \_\_\_\_\_ ( 月 日採血)

B型肝炎ウイルス: HBs 抗原 (+・-) HBs 抗体 (+・-) HBc 抗体 (+・-) HBV-DNA 定量 ( \_\_\_\_\_ ・陰性)

**CHEMOTHERAPY REGIMEN**

1サイクルを28日とし、PDとなるまで繰り返す。

		1週	2週	3週	4週	5週
オプジーボ (ニボルマブ)	480mg/body	↓				↓
シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>	↓				↓
5FU	800mg/m <sup>2</sup>	↓↓↓↓↓				↓↓↓↓↓





## FP + Nivo (シスプラチン + 5FU + オプジーボ) CheckMate648 試験

### day 2 ~ 5 共通

①

大塚生食注100ml  
デキサート6.6mg1V  
60分かけて点滴

②

アセテート3G500ml  
120分かけて点滴

③

アセテート3G500ml  
120分かけて点滴

前日の5FUから持続

テルモ生食1000ml 1袋  
5FU1000mg ( )V  
5FU250mg ( )V  
24時間持続点滴

翌日の5FUへ続く

#### REFERENCES:

Nivolumab Combination Therapy in Advanced Esophageal Squamous-Cell Carcinoma

[N Engl J Med 2022; 386:449-462](#)

制吐剤について：[日本癌治療学会 制吐剤適正使用ガイドライン](#)

FNについて：[日本臨床腫瘍学会 発熱性好中球減少症診療ガイドライン](#)

G-CSFについて：[日本癌治療学会 G-CSF 適正使用ガイドライン](#)

日本臨床腫瘍学会 [がん免疫療法ガイドライン第二版 \(JSMO 会員\)](#)

免疫チェックポイント阻害薬について：各薬剤の適正使用ガイドを参照すること

[オプジーボ](#)

[キイトルーダ](#)

[テセントリク](#)

[イミフィンジ](#)

[バベンチオ](#)

[研修医・コメディカル向け irAE 逆引きマニュアル](#)