



triweekly TC (PACLItaxel/CARBOplatin)

PTX(triweekly) (タキソール)  
+ CBDCA(triweekly) (パラプラチン)

page1 of 2

患者名： 患者カルテ ID： 身長： cm 体重： kg

主治医： 指導医： 年齢： 体表面積： m<sup>2</sup>

**CHEMOTHERAPY REGIMEN**

1 サイクルを 21 日とし、6 回繰り返す。

		day1	day8	day15	day22	...
タキソール (パクリタキセル)	175mg/m <sup>2</sup>	↓			↓	
パラプラチン (カルボプラチン)	AUC6	↓			↓	

**前処置内服**

Rp) レスタミンコーワ錠 10mg ( 5 ) 錠  
点滴①開始時に内服すること

① 生食 100ml 1 本  
アロキシ 0.75mg 1 本  
デカドロン 6.6mg 2 本 } 16.5mg  
デカドロン 1.65mg 2 本  
ガスター 20mg 1 本  
-----  
30 分 (200ml/h)

※嘔吐リスク：中等度 (Moderate)

② 5%大塚糖液 500ml 1 本  
タキソール 175mg/m<sup>2</sup> 30mg ( ) 本  
100mg ( ) 本  
-----  
180 分

タキソールを使用したレジメンは、0.22μのインラインフィルターを用いること。  
タキソールの点滴ラインは PVC フリーのものを用いること。

③ 生食 250ml 1 本  
パラプラチン AUC6 50mg ( ) 本  
150mg ( ) 本  
450mg ( ) 本  
-----  
60 分

④ 生食 50ml 1 本  
-----  
全開  
経過を観察すること

当院婦人科採用：Jelliffe 式 [パラプラチン計算尺]

女性：GFR(ml/min)=(98-0.8×(年齢-20))/(血清クレアチニン(mg/dl))×(藤本式体表面積(m<sup>2</sup>)×0.9/1.73)

パラプラチン投与量(mg/body)=目標 AUC×(25+(上記 GFR))

次ページへ続く



triweekly TC (PACLItaxel/CARBOplatin)

PTX(triweekly) (タキソール)  
+ CBDCA(triweekly) (パラプラチン)

page2of2

**REFERENCES:**

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology™ Ovarian Cancer. V2.2012.  
Ozols RF, et al. *J clin Oncol.* 2003;21(17):3194-200.